



Atropina

Descrição: Fármaco anticolinérgico / parassimpaticolítico que provoca midríase (dilatação pupilar) e cicloplegia (paralisia do músculo ciliar), usado no manejo de uveítes, espasmos ciliares, dor ocular, e para dilatar a pupila durante exames ou pós-cirurgia.

Pontos principais:

- Ajuda a aliviar dor causada por espasmo ciliar (em condições inflamatórias oculares).
- Efeito prolongado possível (duração de dias) dependendo da concentração.
- Pode aumentar a pressão intraocular, especialmente em animais com glaucoma ou predisposição.
- Pode causar redução temporária da produção lacrimal (teste de Schirmer mostrou diminuição de lacrimejamento com uso tópico).
- Uso cauteloso em animais com predisposição a glaucoma, lente luxada ou risco de aumento de pressão intraocular.
- Evitar em casos de glaucoma de ângulo estreito (pode exacerbar).

Forma farmacêutica: Solução e gel.

Apresentação: Colírio e pomada oftálmica.

Concentrações: Todas.

Validade: 6 meses.

Prazo de manipulação: 7 dias úteis para lotes menores que 10 unidades ou 15 dias úteis para lotes maiores que 10 unidades.

Entregas: -

Atropina injetável

Descrição: Fármaco anticolinérgico/antimuscarínico usado via parenteral para vários efeitos: controle de salivação, bradicardia, como antídoto em intoxicações organofosforadas, e como pré-medicação em anestesia.

Pontos principais:

- Aumenta a frequência cardíaca, ajuda em casos de bloqueios atrioventriculares e bradicardia induzida por opióides em cães.
- Reduz secreções salivares, traqueobronquiais e gastrointestinais durante anestesia.
- Usado como antídoto em intoxicações por organofosforados em cães e gatos, inclusive via infusão contínua em casos graves.
- Cuidado em animais com disfunção cardíaca, renal ou hepática, e em pacientes com frequência cardíaca muito alta ou predisposição a arritmias.



atendimento@citopharmavet.com.br

• Efeitos colaterais: boca seca, constipação, retenção urinária, excitabilidade central, taquicardia, entre outros.

Forma farmacêutica: Solução injetável.

Apresentação: Ampola.

Concentrações: 0,5 mg/ml - 1 ml.

Validade: 6 meses.

Prazo de manipulação: 15 dias úteis.

Entregas: -