

Fenilefrina Colírio

APRESENTAÇÃO

Frasco de polietileno contendo 1mL, 2mL, 3mL, 5mL ou 10mL.

Solução estéril oftalmológica.

Via ocular.

Concentração usual: 2% a 10%.

COMPOSIÇÃO

Fenilefrina.

Veículo qsp (cloreto de sódio, cloreto de benzalcônio, metabissulfito de sódio, EDTA dissódico e água destilada).

INDICAÇÃO

O colírio de Fenilefrina é indicado como agente midriático.

FARMACODINÂMICA

A fenilefrina é um agente simpatomimético sintético, com ação direta sobre os receptores alfa-adrenérgicos. A solução a 10% produz midríase após cerca de 20 minutos de sua aplicação e sua ação prolonga-se por até 6 horas.

Nota: Pode ocorrer absorção sistêmica das soluções de fenilefrina a partir de 2,5%. Devido a esta absorção, a solução a 10%, em particular, deve ser evitada ou utilizada com cautela em crianças e idosos.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Deve ser utilizado com cautela em pacientes com arteriosclerose avançada, hipertensão severa ou diabetes mellitus. Não se recomenda o uso em pacientes com glaucoma.

REAÇÕES ADVERSAS

Taquicardia, palpitações, aumento da pressão arterial, aumento da sudorese, cefaleia frontal, sensibilidade dos olhos à luz e lacrimejamento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Instilar no saco conjuntival, conforme critério médico.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), ao abrigo da luz.

Observar o prazo de uso, que é de 06 meses após a data de fabricação.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

O prazo de estabilidade/validade do medicamento após aberto, deverá ser determinado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital, de acordo com as condições internas de uso, treinamento do pessoal envolvido, local e condições de armazenamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.

PRECAUÇÕES

Se o dispositivo conta-gotas tocar nos dedos, na superfície das pálpebras ou no olho, este frasco deverá ser descartado.

Este medicamento não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica. Consulte o médico antes de fazer uso deste medicamento se estiver amamentando.

Não utilizar este colírio durante o uso de lentes de contato gelatinosas ou hidrofílicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - Martindale (The Complete drug reference). Phenylephrine, 32 ed. 1066.