

Anfotericina

Descrição: Antifúngico da classe dos polienos, utilizado topicamente como colírio em solução para tratamento de ceratites fúngicas (ex.: *Candida*, *Aspergillus*, *Fusarium*) em cães, gatos e equinos. Normalmente é preparado a partir do pó liofilizado, reconstituído em solução estéril para uso oftálmico.

Pontos principais:

- Mecanismo: liga-se aos esteróis das membranas fúngicas (ergosterol), causando formação de poros e vazamento de íons/eletrólitos fúngicos.
- Indicações: Ceratite fúngica (mais comum em equinos, mas também em cães e gatos) e infecções oculares por leveduras e fungos filamentosos.
- Exposição prolongada pode causar toxicidade local, irritação ocular, ardor, hiperemia conjuntival e desconforto.
- Idealmente formulado como suspensão ou solução estéril, e aplicação frequente (ex: várias vezes ao dia) é obrigatória para manter níveis antifúngicos na córnea.
- Atenção ao armazenamento: estabilidade, proteção da luz, preparação estéril são críticos para evitar contaminação.

Forma farmacêutica: Liofilizado.

Apresentação: Colírio.

Concentrações: Todas.

Validade: 25% da validade do fabricante.

Prazo de manipulação: 15 dias úteis.

Entregas: -